

หน้าที่ของเจ้าของสุนัขตามพระราชบัญญัติ
โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕

๑. นำสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อสุนัข อายุได้ ๒-๔ เดือน และครั้งต่อไปตามที่กำหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
๒. เมื่อสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วให้ติดเครื่องหมายประจำตัว และเก็บใบรับรองการฉีดวัคซีนไว้ การขายหรือให้สุนัขแก่ผู้อื่นต้องมอบใบรับรองให้ด้วย
๓. โดยเฉพาะสัตว์ที่ไม่มีเครื่องหมายประจำ และถูกเจ้าหน้าที่จับซึ่ง ๕ วัน ถ้าไม่มีผู้ไปรับจะถูกทำลายไม่ปล่อยสัตว์ออกมาในที่สาธารณะ
๔. เมื่อสัตว์มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ให้แจ้งต่อสัตวแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายใน ๒๔ ชั่วโมง



ข้อกำหนด

บทลงโทษตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า
พ.ศ.๒๕๓๕

๑. ผู้ใดฝ่าฝืนไม่นำสัตว์ไปรับการฉีดวัคซีนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
๒. ผู้ใดมีเครื่องหมายแสดงว่าการฉีดวัคซีนปลอมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๓. ผู้ใดขัดขวาง หรือไม่อำนวยความสะดวกในการจับสุนัข ไม่มีเจ้าของในที่สาธารณะ หรือทำลายสุนัขที่เป็นโรคนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ท่านกำลังทำผิดต่อสังคมอย่างใหญ่หลวงถ้าท่าน

๑. ปล่อยสุนัขของท่านเพ่นพ่านในที่สาธารณะโดยไม่ดูแล แล้วสุนัขไปก่อความเดือดร้อน รำคาญ เสียหายแก่ผู้อื่น
๒. ปกปิดเมื่อสุนัขที่เลี้ยงไปกัดกับสุนัขที่บ้าแล้วไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพราะสุนัขนั้นอาจติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก่ออันตรายในภายหลัง
๓. นำสุนัขไปปล่อยตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น วัด โรงเรียน เป็นการผลักรถให้ผู้อื่น

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ตำแหน่งถูกต้อง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตร

www.ald.go.th

(นางสาวฐิติมา วงศ์อินดา)
หัวหน้าสำนักปลัด

เจ้าของสุนัขที่สุนัขออกไปก้นอกบ้านหรือไม่ได้ผูกสุนัขไว้ เมื่อมีคนมาเรียกบอกกล่าวก่อนเข้าบ้าน มีโทษดังนี้

1. ทางแพ่งต้องชดใช้ค่าเสียหาย เช่น ค่ารักษาพยาบาลบาดเจ็บ ค่าวัคซีน ค่าซีรั่มป้องกันโรคสุนัขบ้า ค่าวัคซีนป้องกันบาดทะยัก เป็นต้น ถ้าผู้ถูกกักเสียหายชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า อาจต้องเสียค่าปลงศพรวมไปถึงค่าอุปการะเลี้ยงบุตรให้แก่บุตรผู้เสียหาย
2. ทางอาญาโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น วัว ควาย ม้า หมู ลิง ชะนี กระรอก เสือ แมว ค้างคาว แต่ที่พบมากที่สุดคือสุนัข รองลงมาคือ แมว



การติดต่อและการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้า

สัตว์ที่ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า จะขับเชื้อลงมากับน้ำลายเป็นระยะๆ เชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าในน้ำลายสัตว์ป่วยจะเข้าสู่ร่างกายคนหรือสัตว์อื่นทางบาดแผล รอยขีดข่วน รอยถลอก เยื่อบุตา จมูก ปาก

จะอย่างไรเมื่อถูกสัตว์กัด

1. ล้างแผลด้วยน้ำสบู่หลายๆ ครั้ง
2. ใส่ยาใส่แผล เช่น แอลกอฮอล์ จะช่วยฆ่าเชื้อโรค อย่าใส่สิ่งอื่น เช่น เกลือ ยาฉุน ลงในแผล
3. กักสัตว์ที่กัดไว้ดูอาการอย่างน้อย ๑๐ วัน เว้นแต่สัตว์นั้นดุร้าย กัดคน หรือสัตว์อื่น หรือไม่สามารถกักสัตว์ไว้ได้ให้ทำลาย ถ้าสัตว์หนีหายไป ให้ถือว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
4. รีบไปหาแพทย์หรือสัตวแพทย์ทันทีที่ถูกกัด เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนและซีรั่ม อย่ารอจนสัตว์ที่กัดตาย เมื่อสัตว์ตาย รีบตัดหัวส่งตรวจโรคพิษสุนัขบ้า

จะส่งซากสัตว์วินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างไร

1. ตัดหัวสัตว์ตรงคอใส่ถุงพลาสติกซ้อนหลายๆ ชั้น ใส่ถุงมือทุกครั้งที่ตัดหัวสัตว์
2. ใส่กระติกและใส่น้ำแข็งให้เย็นตลอดเวลา
3. ส่งพร้อมประวัติสัตว์ ชนิด เพศ อายุ สี อาการป่วย ชื่อ ที่อยู่ เจ้าของสัตว์ และผู้ที่ถูกกัด



*** ด้วยความปรารถนาดี ***

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง

จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ ๐-๔๔๗๕-๖๓๗๐

โทรสาร ๐-๔๔๗๕-๑๑๘๕

www.lamkrohong.go.th

(นางสาวรัฐดาภา วงศ์อินท)

หัวหน้าสำนักปลัด

โรคพิษสุนัขบ้า



กลุ่มเสี่ยง



อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี



ถูกกัด ข่วน

แล้วไม่ไปฉีดวัคซีน

การติดต่อของโรค

ถูกสัตว์มีเชื้อ

กัด

ข่วน

เลียบาดแผล



อาการผู้ป่วย

เบื่ออาหาร เจ็บคอ

มีไข้ อ่อนเพลีย



กลัวลม

กลืนลำบาก กลืนน้ำ

คับรุนแรง

บริเวณที่เคยถูกกัด

อัมพาตตาย

ดูอย่างไรว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ระยะแรก

ระยะเริ่มต้น

ระยะอัมพาต

- บดขยี้เปลี่ยน ไม่รุนแรง
- หงุดหงิด เกือบตัว
- หวาดระแวง ปานตาขยาย

- กระวนกระวาย
- กัดไม่เลือก
- เห่าหอน

- น้ำลายไหล
- คางห้อยตก
- ล้มลง ตาย

เกิดจากเชื้อ เรบีสไวรัส (RABIES VIRUS) มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง หมู หนู กระต่าย กระรอก ฯลฯ เป็นพาหะนำโรค


ผู้ติดเชื้อจะมีอาการ ตาย ๑๐๐%

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกกัด - ข่วน-เลีย



ล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาด

หลาย ๆ ครั้ง



กักหมา - แมว

เพื่อสังเกตอาการ ๑๐ วัน



ใส่ยา เบตาดีน



หาหมอหากฉีดวัคซีนต้อง

มาตามนัดทุกครั้ง

คำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยง



ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี



ออกนอกบ้านต้องใส่สายจูง



ฝึกให้ เชื่อฟังคำสั่ง



ทำหมัน คุมกำเนิด

๑. อย่าแหยม

๒. อย่าเหยียบ

๓. อย่าแยก

๔. อย่าหยิบ

๕. อย่ายุ่ง

คาถา
๕ย

กันสุนัขกัด



ทำให้สุนัขโกรธ

ทาง หัว ตัว ขา
ให้สุนัขตกใจ



สุนัขที่กัดกันด้วยมือ

อย่า



อาหารที่สุนัขกำลังกิน

อย่า



กับสุนัขที่ไม่รู้จักร
หรือไม่มีเจ้าของ



กลุ่มงานป้องกันโรค กองสาธารณสุขท้องถิ่น

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค

โรคพิษสุนัขบ้า



อันตราย! แต่ป้องกันได้

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาท จากสัตว์สู่คน เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่สุนัขเท่านั้น แต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ลิง หนู กระต่าย เป็นต้น



ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มี ยารักษา แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน

อาการที่พบในคนหลังจากติดเชื้อพิษสุนัขบ้า



เบื่ออาหาร เจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย มีอาการคัน รุนแรงบริเวณที่ถูกกัด



กระสับ กระส่าย กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อเจ้อ



แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก เกร็ง อัมพาต หมสติ และเสียชีวิต

อาการที่พบในสุนัขหลังจากติดเชื้อพิษสุนัขบ้า

ระยะแรก

สุนัขจะมีอารมณ์และนิสัย เปลี่ยนไปจากเดิม




ระยะที่ ๒

มีอาการที่ทางประสาท คลุ้มคลั่ง กระวนกระวาย ตื่นเต้น ไม่อยู่นิ่ง



ระยะที่ ๓

มีอาการทางตก น้ำลายไหล ขาอ่อน ทรงตัวไม่ได้ล้มลง อัมพาตทั้งตัวอย่างรวดเร็ว และตายในที่สุด



คำแนะนำสำหรับคนเลี้ยงสุนัข

๑. คุณกำเนิดไม่ให้มีสุนัขมากเกินไป
๒. ไม่ปล่อยสุนัขในที่สาธารณะ
๓. นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี

นำสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนได้ที่ อปท. ทั่วประเทศ



ขั้นตอนการป้องกันการติดเชื้อในคน

พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



หลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกสัตว์กัด ทำร้าย



หลังโดนกัด รีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อเข้ารับการรักษา



รับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาล หรือ รพ.สต. ใกล้บ้าน

