



อีโบล่า

รู้ทัน ป้องกันได้

ด้วยความรู้ความเข้าใจจาก องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์



1 อีโบล่า คืออะไร?

อีโบล่า คืออะไร?

โรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรง
จากเชื้อไวรัสอีโบล่า
พบการระบาดมาก
ในทวีปแอฟริกา



2 การติดต่อและอาการ

การติดต่อ



สัมผัสสารคัดหลั่ง
จากผู้ป่วย



หรือสัตว์พาหะ
(ค้างคาวผลไม้, ลิง)



ใช้สิ่งเย็บพ่น
อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย

อาการ



อาเจียน
ท้องเสีย



ปวดกล้ามเนื้อ



เลือดออกทั้งภายใน
และภายนอกอวัยวะ

3 การป้องกัน

วิธีป้องกัน



ล้างมือบ่อยๆ
ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์



หลีกเลี่ยงการสัมผัส
สารคัดหลั่งของผู้ป่วย
เลือด น้ำลาย อุจจาระ
เสมหะ



ไม่สัมผัสสัตว์ป่า
เช่น ค้างคาวผลไม้ ลิง



หากพบกับผู้ที่เดินทาง
แอฟริกา เช่น คองโก ยูกันดา
ถ้ามีไข้ รีบพบแพทย์

4 มาตรการประเทศไทย

มาตรการเฝ้าระวังของไทย



คัดกรองผู้เดินทาง
เข้า-ออกประเทศ
อย่างเข้มงวด



เฝ้าระวัง
สนามบิน ผ่านชายแดน
และสถานพยาบาลทั่วประเทศ



ทีมสอบสวน
ควบคุมโรค พร้อมตอบโต้ทันที



ห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อ
ได้มาตรฐานสากล



มาตรการเตรียมความพร้อมด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่าของ อปท.



องค์การอนามัยโลกประกาศ
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ



พบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
อีโบล่า สายพันธุ์ Bundibugyo
มีอัตราป่วยตายสูง



โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 9
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. 2558



ประกาศให้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและ
สาธารณรัฐยูกันดา เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย
ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีผล 21 พ.ค. 2569

1. ให้ อปท. เฝ้าระวัง & คัดกรอง

สนับสนุนการตรวจเข้มผู้เดินทางจาก/
ผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยง หากมีเหตุสงสัยให้
แยกกัก / กักกัน / คุมไว้สังเกต
อย่างน้อย 21 วัน

2. บูรณาการข้ามหน่วยงาน

ประสานงานระดับพื้นที่ร่วมกับ ด้านควบคุม
โรคฯ, ตม., ท่าอากาศยาน, ฝ่ายปกครอง และ
ความมั่นคง เพื่อติดตามและตรวจสอบถิ่นที่อยู่
ของผู้เดินทาง

3. อปท. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

แจ้งเตือนประชาชน ขอความร่วมมือเลี่ยงการ
เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงและเน้นย้ำการ
สังเกตอาการหลังกลับจากพื้นที่เสี่ยง



เฝ้าระวัง กักกัน ควบคุม ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศ
ที่ถูกประกาศให้เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย/
ประเทศที่มีรายงานการระบาดของโรค ภายใน 21 วัน



พบอาการต้องสงสัย:

ไข้ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ เจ็บคอ อาเจียน
ท้องเสีย เลือดออกผิดปกติ



**ต้องแจ้งเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อทันที
ภายใน 3 ชั่วโมง**



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่มา: ข้อมูลจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กรมควบคุมโรค
หนังสือกรมควบคุมโรค ด่วนที่สุด ที่ สร 0410.7/ว 529 ลว. 22 พ.ค. 2569